

03.06.2025

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Биофел®PCHR (Biofel®PCHR)

(Организация-разработчик: АО «Биовета» (Bioveta a.s.), ул. Коменского 212/12, 683 23
г. Ивановице-на-Гане, Чешская Республика)

Регистрационное удостоверение 203-1-5.14-2031№ПВИ-1-8.8/02617

I Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Биофел®PCHR (Biofel®PCHR)

Международное непатентованное наименование: вакцина для профилактики панлейкопении, калицивирусной, герпесвирусной инфекции и бешенства кошек.

2. Лекарственная форма: эмульсия для инъекций.

Вакцина изготовлена из инаktivированных штаммов вируса панлейкопении (штамм FPV), калицивируса (штамм FCV F), герпесвируса (штамм FHV-1) и вируса бешенства (штамм Vnukovo-32), с добавлением вспомогательных веществ (тиомерсал, масляный адъювант).

3. По внешнему виду вакцина представляет собой эмульсию розового цвета без осадка.

Срок годности вакцины в закрытой, неповрежденной упаковке производителя при соблюдении условий транспортировки и хранения: 2 года с даты выпуска. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

4. Вакцина расфасована по 1,0 мл (одна иммунизирующая доза) в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками.

Флаконы с вакциной упаковываются в пластиковые контейнеры по 2, 5, 10, 20, 50 и 100 иммунизирующих доз.

В каждую единицу потребительской (вторичной) упаковки вкладывают инструкцию по применению на русском языке.

5. Препарат хранят и транспортируют в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 8 °С.

6. Вакцину следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей подлежат утилизации в соответствии с требованиями законодательства.

Пустые флаконы из-под вакцины запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации в соответствии с требованиями законодательства.

8. Биофел®PCHR отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II Биологические свойства

9. Биофел®РСНР - иммунобиологический препарат для ветеринарного применения (вакцина).

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у кошек к возбудителям панлейкопении, калицивирусной, герпесвирусной инфекции и бешенства на 14-21 сутки после ревакцинации, продолжительностью не менее 12 месяцев.

В одной иммунизирующей дозе содержится не менее $10^{3,0}$ TCID₅₀/мл вируса панлейкопении, не менее $10^{5,5}$ TCID₅₀/мл калицивируса, не менее $10^{5,0}$ TCID₅₀/мл герпесвируса, не менее 1 IU/мл вируса бешенства.

III Порядок применения

11. Вакцина Биофел®РСНР предназначена для профилактики панлейкопении, калицивирусной, герпесвирусной инфекции и бешенства кошек.

12. Запрещается вакцинировать клинически больных и /или ослабленных животных.

13. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду и обеспечены средствами индивидуальной защиты. После работы следует тщательно вымыть руки с мылом и переодеться.

В местах работы должна быть аптечка доврачебной помощи.

При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их необходимо промыть большим количеством водопроводной воды.

При случайном введении вакцины человеку место введения необходимо обработать 70% раствором этилового спирта, после чего обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу. При себе необходимо иметь данную инструкцию по применению или этикетку.

14. Вакцинации подлежат кошки, начиная с 3-х месячного возраста. Перед применением вакцину необходимо хорошо встряхнуть.

Вакцину вводят подкожно, в дозе 1 мл независимо от породы и массы животного, подкожно, предпочтительно в область за лопаткой.

Допускается сочетание вакцины Биофел®РСНР в схеме применения с вакциной Биофел®РСН.

Подходящая схема вакцинации определяется на усмотрение и по рекомендации ветеринарного врача в зависимости от эпизоотической ситуации, уровня пассивного иммунитета и индивидуальных особенностей животного в каждом конкретном случае.

За 10 дней до иммунизации следует провести профилактическую дегельминтизацию.

Возможные схемы вакцинации кошек.

Схема № 1. Стандартная программа вакцинации.

Возраст животного	Название вакцины
8-10 недель	Биофел РСН
12-15 недель	Биофел РСНР
Каждые 12 месяцев - Биофел РСНР (бустерная вакцинация)	

Схема № 2. Схема вакцинации для котят с высоким уровнем материнских антител

Возраст животного	Название вакцины
8 недель	Биофел РСН
12 недель	Биофел РСНР
15-16 недель	Биофел РСН*
Каждые 12 месяцев - Биофел РСНР (бустерная вакцинация)	

**В случае высокого уровня МАТ у котят, может потребоваться дополнительная доза РСН в возрасте 15-16 недель*

При проведении вакцинации соблюдают правила асептики и антисептики.

15. Симптомов проявления панлейкопении, калицивирусной, герпесвирусной инфекции и бешенства или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

16. Особенности действия вакцины при ее первом применении и при ее отмене не установлено.

17. Вакцинация беременных кошек возможна в первой половине беременности по рекомендации и на усмотрение ветеринарного врача.

18. Следует избегать нарушения схемы (сроков) вакцинации, так как это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики панлейкопении, калицивирусной, герпесвирусной инфекции и бешенства. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно раньше.

19. При применении вакцины в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. У некоторых животных могут наблюдаться поствакцинальные реакции в виде незначительной отечности в месте инъекции, кратковременное повышение ректальной температуры, общий дискомфорт.

При возникновении гиперчувствительной реакции на компоненты вакцины рекомендуется симптоматическое лечение.

20. Запрещается использовать вакцину Биофел®РСНР совместно с другими иммунобиологическими препаратами. Применение других иммунобиологических препаратов возможно с 14-ти дневным интервалом до или после введения вакцины Биофел®РСНР.

21. Вакцина Биофел®РСНР не предназначена для применения продуктивным сельскохозяйственным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителей лекарственного препарата для ветеринарного применения

АО «Биовета», ул. Коменского 212/12, 683 23, г. Ивановице на Гане, Чешская Республика / «Bioveta, a.s.», Komenskeho 212/12, 683 23, Ivanovice na Hane, Czech Republic

Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

АО «Биовета» (Москва, Россия)
Юридический и фактический адрес:
121069, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, 6-р Новинский, д.18, стр. 1,
ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ VIII, ком. 5
Телефон: +420 517 318 911
e-mail: reklamace@bioveta.cz
Адрес сайта в сети Интернет:
<http://www.bioveta.cz/ru>

Уполномоченный представитель по доверенности АО «Биовета»

Ярослава Навратилова

