

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Стоп - цистит таблеток для лечения и профилактики воспалительно-инфекционных болезней мочевыводящих путей и мочекаменной болезни у кошек и собак (организация - разработчик: ООО «АПИ-САН», г. Москва)

Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Стоп - цистит таблетки (Stop-cystitistablettaa).

Международное непатентованное наименование: нитроксолин, дротаверина гидрохлорид, горца птичьего экстракт, крапивы листьев экстракт, березы листьев экстракт, хвоща полевого травы экстракт, брусники листьев экстракт, солодки корней экстракт.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Стоп цистит таблетки выпускают в двух модификациях:

Наименование сырья	Количество мг/табл.	
	Стоп - цистит таблетки для кошек (120 мг)	Стоп - цистит таблетки для собак (200 мг)
Нитроксолин	12,5	25
Дротаверина гидрохлорид	10	30
Экстракт хвоща	10	10
Экстракт горца птичьего	10	10
Экстракт листьев крапивы	10	10
Экстракт корня солодки	10	10
Экстракт листьев брусники	10	10
Экстракт листьев березы	10	10
Карбоксиметилцеллюлоза	24,85	63,9
Натрия гликолят крахмала	7,2	12
Поливинилпирролидон	4,2	7
Оболочка «Opadry»	1,25	2,1

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой таблетки круглой формы, покрытые оболочкой, от светло-зеленого до темно-зеленого цвета.

3. Выпускают Стоп - цистит таблетки, расфасованными в блистерах из пленки полихлорвиниловой и фольги алюминиевой или в полимерных и стеклянных банках с полимерными крышками. Блистеры и банки упаковывают поштучно в картонные пачки.

Срок годности Стоп - цистит таблеток при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года со дня производства.

Запрещается применение Стоп - цистит таблеток по истечении срока годности.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 10°C до 25°C.

5. Стоп - цистит таблетки следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Фармакологические свойства

7. Стоп - цистит таблетки относятся к группе комбинированных противомикробных лекарственных препаратов. Стоп - цистит таблетки обладают выраженным противомикробным, противовоспалительным, антисептическим, спазмолитическим, диуретическим и салуретическим действием. Нитроксолин, входящий в состав лекарственного препарата, является производным 8-оксихинолина, активен в отношении широкого спектра грамположительных, грамотрицательных бактерий и некоторых грибов, вызывающих инфекции мочевых путей, в том числе *Staphylococcus* spp., *Ureaplasma urealyticum*, *Corynebacterium* spp., *Escherichia coli*, *Salmonella* spp. Дротаверина гидрохлорид оказывает продолжительное спазмолитическое, мио-тропное и сосудорасширяющее действие, устраняет спазмы гладкой мускулатуры мочевыводящих путей и тенезмы мочевого пузыря. Комплекс биологически активных компонентов лекарственных растений (флаво-ноиды, эфирные масла, дубильные вещества, витамины, минеральные соединения) обладает антисептическими, мочегонными спазмолитическими и противовоспалительными свойствами, способствуют выведению конкрементов при мочекаменной болезни. Стоп-цистит таблетки по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.07-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и sensibilizing действия.

Порядок применения

8. Стоп-цистит таблетки назначают собакам и кошкам для лечения и профилактики острых и хронических воспалительно-инфекционных болезней мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит, уретрит) и мочекаменной болезни, профилактики инфекций при диагностических процедурах и в послеоперационный период после удаления мочевых камней у кошек и собак.

9. Противопоказанием к применению является острая сердечная и печеночная недостаточность, повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата. Беременным и лактирующим животным препарат следует применять после консультации с лечащим ветеринарным врачом.

10. Стоп - цистит таблетки применяют животным индивидуально с кормом или вводят непосредственно на корень языка с лечебной целью два раза в сутки, с профилактической один раз в сутки в течение 5-7 дней, в следующих дозах:

Вид и масса животного		Разовая доза Стоп - цистит таблеток на животное	
		«для кошек»	«для собак»
кошки	до 5 кг	1	-
	от 5 кг	1 ½	-
собаки	до 10 кг	-	1
	от 10 до 20 кг	-	1 ½
	от 20 до 30 кг	-	1 ½ -2
	от 30 до 40 кг	-	2-3
	свыше 40 кг	-	3-4

Продолжительность курса применения лекарственного препарата определяет лечащий ветеринарный врач в зависимости от физиологического состояния животного и течения болезни.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. При первом применении лекарственного препарата у животного может наблюдаться обильное слюнотечение.

13. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной

чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций использование Стоп - цистит таблеток следует прекратить.

15. Стоп - цистит таблетки совместим с другими лекарственными препаратами, кормами и кормовыми добавками.

16. Стоп - цистит таблетки не предназначены для применения продуктивным животным.