

## Показания к применению.

ЭКС применяют сукам и кошкам для прерывания и задержки течки (сдвигает ее наступление во времени), чтобы избежать случайного спаривания и предотвращения появления нежелательного потомства; кобелям и котам для снижения половой активности и коррекции поведенческих проблем в период половой охоты (уменьшает агрессивность, повышенную возбудимость, гиперсексуальность и ослабляет склонность метить территорию). Доза зависит от пола животного и цели применения.

## Противопоказания.

Противопоказанием к применению суспензий и таблеток ЭКС является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препаратов.

Препараты противопоказаны животным при заболеваниях половой системы (пиометра, метрит, эндометрит и т.д.), опухолях молочной железы, диабете, до полового созревания животных, беременным и кормящим самкам.

Молодым животным в первую течку применять препарат не рекомендуется из-за трудности определения времени начала цикла.

## Побочные явления.

При применении ЭКС в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае длительного или повторного использования возможны перемена характера (агрессивность или угнетение), увеличение молочных желез, аппетита и связанное с этим увеличение веса животного.

## Дозы и порядок применения.

Суспензии применяют перорально в виде капель, таблетки – принудительно на корень языка или растертыми в порошок с небольшим количеством лакомства за 1-2 часа до основного кормления животного.

Необходимо записать дату начала течки и дату начала применения препарата.

Перед применением флакон (или пипетку) с ЭКС-5 или ЭКС-7,5 встряхивают в течение одной минуты до получения однородной суспензии.

Таблица 1

**Рекомендации по применению для кошек и котов суспензий для орального применения ЭКС-5 и ЭКС-7,5**

Таблица 1

## Рекомендации по применению для кошек и котов суспензий для орального применения ЭКС-5 и ЭКС-7,5

| Показания к применению                                                       | Доза мегестрола ацетата                                   | Дозировка ЭКС-5                                                               | Дозировка ЭКС-7,5                                                              | Начало применения                                                                                     | Длительность курса применения                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Для задержки течки у кошек                                                   | 2,5 мг каждую неделю или 5 мг один раз каждые две недели. | 4 капли (0,125 мл) каждую неделю или 8 капель (0,25 мл) один раз в две недели | 2-3 капли (0,09 мл) каждую неделю или 5 капель (0,17 мл) один раз в две недели | В период между течками вне сезона размножения. Запрещается применение средства во время беременности. | Продолжать применение не более 18 месяцев подряд. Перед началом другого курса применения средства рекомендуется дожидаться нормального физиологического цикла (течки). |
| Для прерывания течки у кошек                                                 | 5 мг ежедневно                                            | 8 капель (0,25 мл) ежедневно                                                  | 5 капель (0,17 мл) ежедневно                                                   | Не позже, чем на третий день после появления первых признаков течки.                                  | В течении 5-7 дней до исчезновения признаков течки. Рекомендуется прерывать течку не чаще двух раз в год.                                                              |
| Для снижения половой активности и коррекции нежелательного поведения у котов | 5 мг ежедневно                                            | 8 капель (0,25 мл) ежедневно                                                  | 5 капель (0,17 мл) ежедневно                                                   |                                                                                                       | В течение 5-7 дней, затем эта же доза (5 мг) 1 раз в неделю. Рекомендуется применять средства с учетом модификации поведения животного.                                |

Таблица 2

Рекомендации по применению для сук и кобелей

| Показания<br>к<br>применению     | Начало<br>применения                                          | Ежедневная<br>доза меге-<br>строла<br>ацетата на<br>1 кг веса<br>животного | Ежедневная<br>доза ЭКС-5                                       | Ежедневная<br>доза<br>ЭКС-7,5                                 | Длительность<br>курса<br>применения                                                                                                                                                                                                                                | Примечания                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Для<br>задержки<br>течки у сук   | За 7-15 дней<br>до начала<br>течки                            | 0,5 мг /кг                                                                 | 4 капли<br>(0,125 мл)<br>на каждые 5<br>кг веса жи-<br>вотного | 3 капли<br>(0,1 мл)<br>на каждые<br>5 кг веса<br>животного    | Течка может<br>начаться через<br>несколько<br>дней после<br>прекращения<br>применения<br>средства. При<br>дли-<br>тельном<br>применении<br>(около<br>месяца),<br>течка начнётся<br>через два –<br>девять<br>месяцев (чаще<br>всего через<br>три-шесть<br>месяцев). | Течка может<br>начаться через<br>несколько<br>дней после<br>прекра-<br>щения<br>применения<br>средства. При<br>длительном<br>примене-<br>нии (около<br>месяца),<br>течка начнётся<br>через<br>два – девять<br>месяцев<br>(чаще всего<br>через<br>три-шесть<br>месяцев). |
| Для<br>прерывания<br>течки у сук | Не позже<br>чем на<br>третий день<br>после<br>начала<br>течки | 2 мг/кг                                                                    | 15 капель<br>(0,5 мл)<br>на каждые 5<br>кг веса жи-<br>вотного | 10 капель<br>(0,33 мл)<br>на каждые<br>5 кг веса<br>животного | Время начала<br>следующей<br>течки зависит<br>от того,<br>насколько<br>рано дается<br>средство и<br>индивидуально<br>для каждой<br>собаки. Обыч-<br>но течка<br>начинается<br>через<br>два – девять<br>месяцев (чаще<br>всего через<br>три-шесть<br>месяцев).      | Время начала<br>следующей<br>течки зависит<br>от того,<br>насколько<br>рано дается<br>средство<br>и<br>индивидуально<br>для каждой<br>собаки. Обыч-<br>но течка<br>начинается<br>через<br>два – девять<br>месяцев<br>(чаще всего<br>через<br>три-шесть<br>месяцев).     |

|                                                                                            |  |          |                                                  |                                                   |                                                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Применение для снижения половой активности и коррекции не-желательного поведения у кобелей |  | 2 мг /кг | 15 капель (0,5 мл) на каждые 5 кг веса животного | 10 капель (0,33 мл) на каждые 5 кг веса животного | Рекомендуется применять средство с учетом модификации поведения животного. | Рекомендуется применять средство с учетом модификации поведения животного. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## Особые указания.

ЭКС совместимы с негормональными лекарственными препаратами и кормовыми добавками. Не рекомендуется длительное совместное применение с кортикостероидами.